

## *Acer platanoides* L. ACERO RICCIO

FAMIGLIA: *Sapindaceae*

AREA DI DISTRIBUZIONE: Europa, Asia Occidentale

### CARATTERISTICHE BOTANICHE

#### **Portamento:**

Fusto slanciato, corteccia grigia, liscia o reticolata

Chioma globosa

Altezza max.: 20-25 m

Diametro max. della chioma: 10-15 m

#### **Foglie:**

Caduche

Colore: verde brillante più scuro nella pagina superiore

Forma: palmato-lobata (5 lobi), appuntita

Spine: assenti

#### **Fiori:**

Infiorescenze in corimbi eretti gialli

Fioritura: non ornamentale da aprile a maggio, prima della fogliazione

Profumo: assente

#### **Frutti:**

Disamara alata

Fruttificazione: non ornamentale

#### **Parti tossiche della pianta:**

Nessuna

#### **Velocità di crescita:**

Media

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI:

**Esigenze pedologiche:** preferisce terreni ricchi ben drenati.

**pH ottimale:** neutro

**Esposizione:** pieno sole, mezz'ombra

**Resistenza alla siccità:** media

**Resistenza alla salinità:** alta

### TIPOLOGIE D'USO:

**Viale alberato:** adatta con distanze di impianto di 10 m sulla fila

**Piccoli giardini:** poco adatta

**Parchi:** molto adatta

### CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Pianta tipica di viali alberati, grandi giardini e spazi urbani aperti.

Legno di facile lavorazione ma poco usato in falegnameria: viene utilizzato per la produzione di strumenti musicali.

Soffre la tracheomicosi da *Verticillium* spp., malattia fungina incurabile e mortale per questa specie.

*Acer platanoides*

